

## 子どもの予防接種の種類(定期予防接種)

種別	無料の期間	おすすめ接種時期	回数	接種間隔		
ロタ	1価 (ロタリックス)	生後6週0日～ 24週0日	生後2か月～ <b>1回目は生後14週6日 までに受けましょう</b>	2回		
	5価 (ロタテック)	生後6週0日～ 32週0日		3回		
B型肝炎	不活化	1歳未満	生後2～9か月未満	3回		
五種混合 (百日咳、ジフテリア、破傷風、 不活化ポリオ、ヒブ) <b>令和6年4月から定期に追加</b>	不活化	1期 初回	生後2か月～ 7歳6か月未満	3回		
	不活化	1期 追加	初回(3回目)接種後 6～18か月未満	1回		6か月以上 (おすすめは 6～18か月)
四種混合 (百日咳、ジフテリア、 破傷風、不活化ポリオ)	不活化	1期 初回	生後2か月～ 7歳6か月未満	3回		
	不活化	1期 追加	初回(3回目)接種後 12～18か月未満	1回		6か月以上 (おすすめは 12～18か月)
ヒブ	不活化	初回	生後2か月～ 5歳未満	3回		
	不活化	追加	初回(3回目)接種後 7～13か月未満	1回		7か月以上 (おすすめは7～13か月)
小児用肺炎球菌	不活化	初回	生後2か月～ 5歳未満	3回		
	不活化	追加	初回(3回目)接種後 生後12～15か月未満	1回		生後12か月以降、 60日以上(おすすめ は生後12～15か月)
BCG	注射生	1歳未満	生後5～8か月未満	1回	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>〈BCG・MR・水ぼうそう〉 異なる注射生ワクチンを別の日に接種する場合は27日以上の間隔をあげましょう。</p> </div>	
麻しん風しん混合 (MR)	注射生	1期	1～2歳未満	1回		
	注射生	2期	小学校入学前の1年間(年長児) H30年4月2日～H31年4月1日生	1回		
水ぼうそう	注射生	1～3歳未満	1回目:1歳～1歳3か月未満 2回目:1回目接種後6か月～1年あける	2回		
日本脳炎	不活化	1期 初回	生後6か月～ 7歳6か月未満	3歳		
		1期 追加		4歳 (1期2回目接種後1年)		1回
		2期	9～13歳未満	9歳		1回
二種混合 (ジフテリア、破傷風)	不活化	11～13歳未満	11歳	1回	三種混合または四種混合の追加(2期)として接種します	
HPV (子宮頸がん)	不活化	H9年4月2日～ H25年4月1日生の女性	中学1年生		詳細は12ページへ	