

子どもの予防接種の種類

●定期予防接種(無料)

種別		無料の期間	おすすめ接種時期	回数	接種間隔
ロタ	経口生	1価 (ロタリックス)	生後6週0日～ 24週0日	2回	1回目 2回目 27日以上
		5価 (ロタテック)	生後6週0日～ 32週0日	3回	1回目 2回目 3回目 27日以上 27日以上
B型肝炎	不活化	1歳未満	生後2～9か月未満	3回	1回目 2回目 3回目 27日以上 1回目から139日以上
五種混合 (百日咳、ジフテリア、破傷風、 不活化ポリオ、ヒブ)	不活化	1期 初回	生後2か月～ 7歳6か月未満	3回	初回1回目 2回目 3回目 追加 20日以上 20日以上 6か月以上 (おすすめは6～18か月)
		1期 追加	初回(3回目)接種後 6～18か月未満	1回	
小児用肺炎球菌	不活化	初回	生後2か月～ 5歳未満	3回	初回1回目 2回目 3回目 追加 27日以上 27日以上 生後12か月以降、 60日以上(おすすめは生後12～15か月)
		追加	初回(3回目)接種後 生後12～15か月未満	1回	
BCG	注射生	1歳未満	生後5～8か月未満	1回	〈BCG・MR・水ぼうそう〉 異なる注射生ワクチンを別の 日に接種する場合は27日以 上の間隔をあげましょう。
麻しん風しん混合 (MR)	注射生	1期	1～2歳未満	1回	
		2期	小学校入学前の1年間(年長児) H31年4月2日～R2年4月1日生	1回	
水ぼうそう	注射生	1～3歳未満	1回目:1歳～1歳3か月 未満 2回目:1回目接種後6か 月～1年あける	2回	1回目 2回目 3か月以上(おすすめは6か月～1年) 水ぼうそうにかかったことがある方は接種不要
日本脳炎	不活化	1期 初回	生後6か月～ 7歳6か月未満	2回	1期1回目 2回目 1期追加 2期 6日以上 6か月以上 (おすすめは1年)
		1期 追加	(1期2回目接種後1年)	1回	
		2期	9～13歳未満	1回	●特例対象者 H17年4月2日～H19年4月1日生 まれの方は、20歳未満まで無料で不 足分(最大4回)を接種できます。
二種混合 (ジフテリア、破傷風)	不活化	11～13歳未満	11歳	1回	三種混合または四種混合の追加 (2期)として接種します

●任意予防接種(有料)

種別		助成の期間	回数	おすすめ接種時期
おたふくかぜ	注射生	1歳～小学校入学前	2回	1回目:1歳 2回目:小学校入学前の1年間(年長児)

助成額 1回4,000円(上限2回)

指定医療機関の窓口で、4,000円を差し引いた金額が請求されます