

～効果的な水管理で有効茎歩合の高い稲づくりを～

1 6月10日現在の生育状況 ～初期生育は概ね順調～

田植後は好天が続き、5月6半旬以降6月2半旬にかけて日照時間が多く、気温の日較差が大きい気象で経過したことから、初期生育は概ね順調です。

6月10日調査では草丈、茎数、葉数とも平年を上回っております。特に田植日の早いBほ場の生育は旺盛となりましたが、その他4地点のほ場はほぼ平年並みの生育となっています。

田植時期や、ほ場内での藻類（カナ）の発生状況等により、ほ場間差の大きい状況ですので、今後は生育に応じた管理が重要となります。

○水稲定点調査結果（6月10日）

品 種	水稲定点調査ほ場	田植 月日	6月10日		
			草丈 cm	茎数 本/m ²	葉数 葉
あきたこまち	A	5月16日	24.7	159	6.5
	B	5月17日	29.6	374	6.7
	C	5月21日	26.5	170	6.6
	D	5月24日	28.3	246	6.2
	E	5月23日	28.7	189	6.2
	本 年	5月20日	27.6	228	6.4
	平 年	5月20日	26.1	185	6.2
	平年比(%±)	0	106%	123%	0.2

2 今後の管理のポイント

田植え後は、水管理により稲の生育促進を図るとともに、茎数確保に努めましょう。茎数確保ができ次第、中干しへ移行し、弱勢茎を抑えて、有効茎歩合の高い稲体づくりに努めましょう。

①分げつの発生を促進させる水管理

○分げつ発生は、昼夜の水温較差が大きい場合に促進されます。このため、入水は水温の低い早朝に行い、日中は止め水とし水温の上昇を図ります。

○水深は、3cm程度の浅水を基本とします。ただし、日中の最高気温が15℃以下の低温時には、やや深水にし、保温に努めます。

○生育の旺盛なほ場では中干し前の深水管理により分げつを抑えることも有効です。

②還元（ワキ）対策

○気温が上昇すると、土壌還元（ワキ）が起こりやすくなります。ほ場に足を踏み込んだ時に気泡が発生し、下葉の黄化が見られる場合は、短時間の落水や間断かん水等を行い、根の健全化に努めます。

落水する場合は、除草剤やオリゼメート粒剤等の散布後日数に注意してください。

③適期の中干しによる弱小茎の抑制

- 中干しは、弱勢茎（穂になりにくい茎）の発生を抑制するとともに、受光体制が良くなるため、倒伏軽減効果等が期待できます。
- 6月下旬頃、目標穂数と同数の茎数（70株植で株20～22本程度、60株植で株24～25本程度）を確保したら直ちに中干しに入りましょう。中干しの期間は7～10日程度で、軽く足跡が付く程度（亀裂が1～2cm程度）を目安とします。
- 既に生育が旺盛なほ場は、早期に目標茎数に達すると見込まれます。ほ場毎の生育状況に合わせて早めの中干しを開始してください。また、生育が遅れ、茎数が確保できていない場合は、中干しの開始時期を遅らせてください。
- 中干し始めに溝掘りを行うと、その後の水管理や秋作業がスムーズにできるので、積極的に行ってください。

【カドミウム吸収抑制対策について】

- カドミウム吸収抑制対策として、出穂3週間前から出穂3週間後まで長期間の湛水管理に備え、中干しは遅れないようにしっかりと行ってください。

3 主要病害虫の防除対策

①いもち病

本田の葉いもち発生を防ぐことで、穂いもちの被害を未然に防ぐことができます。以下の点に注意して、葉いもちの発生を予防してください。

- 本田葉いもち防除は、箱施用剤、側条施用剤、水面施用剤のいずれかで必ず実施します。箱施用剤や側条施用剤を使用しなかった場合は、オリゼメート粒剤を6月15日頃（6月12～18日）に10a当たり2kg散布します。
- 補植用の余り苗は葉いもち病が発生しやすく、周辺ほ場への強力な伝染源となります。補植終了後は、水田の泥の中に埋めるなどして、完全に処分してください。

②斑点米カメムシ類

斑点米カメムシ類は、着色粒発生の原因となり、米の品質低下を助長します。主要加害種であるアカスジカスミカメやアカヒゲホソミドリカスミカメは、休耕田や畦畔等のイネ科雑草で増殖し、これらが水田に侵入して加害することから、雑草防除を徹底しましょう。

- 農道・畦畔の草刈りは稲が出穂する15～10日前までに数回行います。草刈りは地域でまとまって徹底して行うことで、斑点米カメムシ類の生息地における密度低下に努めましょう。
- 本県の主要な加害種であるアカスジカスミカメは、ホタルイ類等のカヤツリグサ科雑草やノビエが水田内で多発していると、その雑草の穂に産卵・増殖します。
- 一発処理除草剤で水田内の雑草を抑えきれなかったほ場は、中・後期除草剤を適切に使用して、水田内の雑草防除を徹底しましょう。

4 中・後期除草剤の適正な使用

- 中・後期除草剤の使用にあたっては、雑草の草種や生育程度に応じて適切な剤を選択して下さい。
- 散布時期や散布時の水管理は、薬剤によって異なるので、ラベルをよく読んで適正に使用して下さい。